

2021

MATHEMATICS — GENERAL

Paper : GE/CC-2

Full Marks : 65

*Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.*

প্রাক্তিক সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।

[Throughout the question paper, notations/symbols carry their usual meanings]

বিভাগ - ক

(মান : ১০)

১। সঠিক উত্তর বেছে নাও :

১×১০

(ক) $\left\{ (-1)^n \cdot n \right\} = \{-1, 2, -3, 4, \dots\}$ অনুক্রমটি হল

(অ) নীচে সীমাবদ্ধ

(আ) উপরে সীমাবদ্ধ

(ই) দোদুল্যমান

(ঙ্গ) এদের কোনোটিই নয়।

(খ) যদি $f(x) = (x-1)^3$, $x \in R$ হয়, তাহলে,

(অ) $x = 1$ -এ f -এর চরম মান আছে।

(আ) $x = 1$ -এ f -এর অবম মান আছে।

(ই) $x = 1$ -এ f -এর চরম বা অবম কোনো মান নাই।

(ঙ্গ) এদের কোনোটিই নয়।

(গ) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}$ শ্রেণিটি

(অ) অভিসারী

(আ) অপসারী

(ই) দোদুল্যমান

(ঙ্গ) এদের কোনোটিই নয়।

(ঘ) $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = e^x$ অবকল সমীকরণটির বিশেষ অবিচ্ছেদ্য (P.I.) হল

(অ) $\frac{1}{2}x^2e^x$

(আ) x^2e^x

(ই) xe^x

(ঙ্গ) এদের কোনোটিই নয়।

Please Turn Over

(গ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ -এর মান হল

(অ) 1

(আ) $\frac{1}{2}$

(ই) $\frac{1}{3}$

(ঙ্গ) $\frac{1}{6}$ ।

(চ) যদি $|\vec{p}| = 10$, $|\vec{q}| = 1$ এবং $|\vec{p} \times \vec{q}| = 8$ হয় তখন $\vec{p} \cdot \vec{q}$ -এর মান হল

(অ) 4

(আ) 8

(ই) 6

(ঙ্গ) এদের কোনোটিই নয়।

(ছ) $\vec{\alpha} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{\beta} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$ ভেস্টের দুটির মধ্যবর্তী কোণ-এর মান হল

(অ) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{15}\right)$

(আ) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{15}\right)$

(ই) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$

(ঙ্গ) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{15}\right)$ ।

(জ) বুলীয় বীজগণিতে $xy(x' + y')$ -এর মান হল

(অ) 1

(আ) x^2

(ই) y^2

(ঙ্গ) 0।

(ঝ) $az + b = a^2x + y$ অপেক্ষকটি থেকে $a (\neq 0)$ এবং $b (\neq 0)$ অপসারণ করলে যে আংশিক অবকল সমীকরণ (partial differential equation) পাওয়া যাবে, সেটি হল

(অ) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$

(আ) $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 1$

(ই) $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0$

(ঙ্গ) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ ।

(ঞ্জ) ধরা যাক $d = \gcd(a, b)$ তাহলে $ax + by = c$ রৈখিক ডায়াফান্টাইন (Diophantine) সমীকরণটির সমাধান থাকবে যখন এবং কেবলমাত্র যখন

(অ) a, d দ্বারা বিভাজ্য

(আ) b, d দ্বারা বিভাজ্য

(ই) c, d দ্বারা বিভাজ্য

(ঙ্গ) এদের কোনোটিই নয়।

(3)

T(2nd Sm.)-Mathematics-G/(GE/CC-2)/CBCS

বিভাগ - খ

(Differential Calculus II)

(ইউনিট - ১)

(মান : ১৫)

যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

২। দেখাও যে, $\{u_n\}$ অনুক্রমটি ক্রমবর্ধমান এবং উপরে সীমাবদ্ধ যখন $u_n = \frac{3n}{n+1}, n \in \mathbb{N}$ এটির সীমা নির্ণয় করো। ২+২+১

৩। (ক) একটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো : দোলুয়মান অসীম শ্রেণি।

(খ) $x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{x^7}{7} + \dots \dots$ শ্রেণিটির অভিসারিত পরীক্ষা করো। ২+৩

৪। (ক) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 - \sin x) \tan x$ -এর মান নির্ণয় করো।

(খ) $f(x) = 4 - (6 - x)^{\frac{2}{3}}$ অপেক্ষকটিতে [5, 7] অন্তরে Lagrange's Mean Value theorem প্রয়োগ করা যাবে কিনা পরীক্ষা করে দেখাও। ২+৩

৫। $f(x) = x - \log(1 + x^2), x \in \mathbb{R}$ অপেক্ষকটির চরম এবং অবম মান (যদি থাকে) নির্ণয় করো। ৫

৬। Lagrange-র “অনির্ধারিত গুণক-এর সাহায্যে প্রমাণ করো যে $u = x^2 + y^2 + z^2$ -এর প্রাপ্তিক মান পাওয়া যাবে যখন $x = \frac{30}{19}, y = \frac{45}{19}, z = \frac{75}{19}$, যেখানে শর্ত হল $2x + 3y + 5z = 30$ । ৫

বিভাগ - গ

(Differential Equation II)

(ইউনিট - ২)

(মান : ৫)

যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৫×১

৭। সমাধান করো : $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + 2y = \cos(\log x)$

৮। Lagrange's পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত আংশিক অবকল সমীকরণটি (Partial Differential Equation) সমাধান করো : $\tan x \frac{\partial z}{\partial x} + \tan y \frac{\partial z}{\partial y} = \tan z$

Please Turn Over

বিভাগ - ঘ

(Vector Algebra)

(ইউনিট - ৩)

(মান : ৫)

যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৫×১

৯। যদি $\vec{\alpha} = \frac{1}{7}(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$, $\vec{\beta} = \frac{1}{7}(3\hat{i} - 6\hat{j} + 2\hat{k})$ এবং $\vec{\gamma} = \frac{1}{7}(6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$ । তখন $|\vec{\alpha}|, |\vec{\beta}|, |\vec{\gamma}|$ -এর মান নির্ণয় করো এবং দেখাও যে, $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ পরস্পরের সহিত লম্ব ও $\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \vec{\gamma}$ ।

১০। 15 একক-এর একটি বল $\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেস্টেরের দিকে (Direction) $(2, -2, 2)$ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে। বলটির টর্ক $(1, 1, 1)$ বিন্দুতে [moment about the point $(1, 1, 1)$] নির্ণয় করো।

বিভাগ - ৬

(Discrete Mathematics)

(ইউনিট - ৮)

(মান : ৩০)

যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১১। (ক) Mathematical Induction-এর সাহায্যে প্রমাণ করো যে, $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ $n \in \mathbb{N}$.

(খ) $5x + 7y = 100$ -এর ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার সমাধান (Positive integral solutions) নির্ণয় করো।

৫+৫

১২। (ক) সর্বনিম্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাটি (Least positive integer) নির্ণয় করো যেটিকে 3, 5 ও 11 দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে 2, 3 ও 4 ভাগশেষ থাকবে।

(খ) যদি $\gcd(a, b) = 1$ হয়, তবে প্রমাণ করো $\gcd(a^2, b^2) = 1$

৫+৫

১৩। (ক) Wilson-এর উপপাদ্যটি লেখো। 7^{100} এর একক হালীয় অঙ্কটি বের করো।

(খ) $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$ কে 15 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে নির্ণয় করো।

৫+৫

১৪। (ক) নিম্নলিখিত ISBNটি সঠিক কিনা নির্ণয় করো— 81-213-0871-9।

(খ) প্রমাণ করো, $\phi(5n) = 5\phi(n)$ যখন এবং কেবলমাত্র যখন $n, 5$ দ্বারা বিভাজ্য।

৫+৫

- ১৫। (ক) $f = x \cdot y' + (y+z)' \cdot (x+y)$ বুলীয় অপেক্ষকটিকে x, y, z চলরাশির জন্য DNF-এ রূপান্তরিত করো।
 (খ) একটি Switching Circuit নির্মাণ করো যেটি নীচের সত্যসারণীকে সিদ্ধ করে। Circuit-টিকে সরলীকৃত করো। ৫+৫

x	y	z	$f(x, y, z)$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	0
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	0	0

[English Version]

The figures in the margin indicate full marks.

Group - A

(Marks : 10)

1. Choose the correct alternatives : 1×10

- (a) The sequence $\{(-1)^n \cdot n\} = \{-1, 2, -3, 4, \dots\}$ is,
- (i) bounded below
 - (ii) bounded above
 - (iii) oscillatory
 - (iv) None of these.
- (b) If a function f be defined by $f(x) = (x-1)^3, x \in R$, then
- (i) f has maximum at $x = 1$
 - (ii) f has minimum at $x = 1$
 - (iii) f has neither maximum nor minimum at $x = 1$
 - (iv) None of these.
- (c) The series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}$ is
- (i) convergent
 - (ii) divergent
 - (iii) oscillatory
 - (iv) None of these.

Please Turn Over

(d) The particular integral of $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = e^x$ is

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (i) $\frac{1}{2}x^2e^x$ | (ii) x^2e^x |
| (iii) xe^x | (iv) None of these. |

(e) The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ is

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (i) 1 | (ii) $\frac{1}{2}$ |
| (iii) $\frac{1}{3}$ | (iv) $\frac{1}{6}$. |

(f) If $|\vec{p}|=10$ and $|\vec{q}|=1$ and $|\vec{p} \times \vec{q}|=8$, then the value of $\vec{p} \cdot \vec{q}$ is

- | | |
|---------|---------------------|
| (i) 4 | (ii) 8 |
| (iii) 6 | (iv) None of these. |

(g) The angle between the vectors $\vec{\alpha} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{\beta} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$ is

- | | |
|---|---|
| (i) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{15}\right)$ | (ii) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{15}\right)$ |
| (iii) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$ | (iv) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{15}\right)$. |

(h) In Boolean Algebra $xy(x' + y')$ is equal to

- | | |
|-------------|------------|
| (i) 1 | (ii) x^2 |
| (iii) y^2 | (iv) 0. |

(i) The partial differential equation obtained by eliminating the arbitrary constant $a (\neq 0)$ and $b (\neq 0)$ from the function $az + b = a^2x + y$ is

- | | |
|---|--|
| (i) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ | (ii) $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ |
| (iii) $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ | (iv) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$. |

(j) Let $d = \gcd(a, b)$. Then the Diophantine equation $ax + by = c$ has a solution iff

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (i) d divides a | (ii) d divides b |
| (iii) d divides c | (iv) None of these. |

Group - B
(Differential Calculus II)
(Unit - 1)
(Marks : 15)

Answer **any three** questions.

2. Show that the sequence $\{u_n\}$ is monotonic increasing and bounded above when $u_n = \frac{3n}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$. Find its limit. 2+2+1

3. (a) Define an oscillatory infinite series with an example.

- (b) Examine the convergence of the series :

$$x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \dots$$

2+3

4. (a) Evaluate $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 - \sin x) \tan x$.

- (b) Examine whether Lagrange's Mean Value theorem can be applied to the function $f(x) = 4 - (6 - x)^{\frac{2}{3}}$ in the interval $[5, 7]$. 2+3

5. Find the maxima and minima (if exists) of $f(x) = x - \log(1 + x^2)$, $x \in \mathbb{R}$. 5

6. Using the Lagrange's method of undetermined multiplier, show that an extreme value of $u = x^2 + y^2 + z^2$, subject to the condition $2x + 3y + 5z = 30$ is attained at $x = \frac{30}{19}$, $y = \frac{45}{19}$, $z = \frac{75}{19}$. 5

Group - C
(Differential Equation II)
(Unit - 2)
(Marks : 5)

Answer **any one** question. 5×1

7. Solve : $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + 2y = \cos(\log x)$.

Please Turn Over

8. Solve the following linear partial differential equation by Lagrange's method : $\tan x \frac{\partial z}{\partial x} + \tan y \frac{\partial z}{\partial y} = \tan z$.

Group - D
(Vector Algebra)
(Unit - 3)
(Marks : 5)

Answer **any one** question.

5×1

9. If $\vec{\alpha} = \frac{1}{7}(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$, $\vec{\beta} = \frac{1}{7}(3\hat{i} - 6\hat{j} + 2\hat{k})$ and $\vec{\gamma} = \frac{1}{7}(6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$. Find $|\vec{\alpha}|, |\vec{\beta}|, |\vec{\gamma}|$ and show that $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ are mutually perpendicular and $\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \vec{\gamma}$.
10. A force of 15 units acts in the direction of the vector $\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and passes through a point $(2, -2, 2)$. Find the moment of the force about the point $(1, 1, 1)$.

Group - E
(Discrete Mathematics)
(Unit - 4)
(Marks : 30)

Answer **any three** questions.

11. (a) Prove by mathematical Induction $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ $n \in \mathbb{N}$.
(b) Find all positive integral solutions of $5x + 7y = 100$. 5+5
12. (a) Find the least positive integer which yields remainders 2, 3 and 4 when divided by 3, 5 and 11 respectively.
(b) Prove that $\gcd(a^2, b^2) = 1$ if $\gcd(a, b) = 1$. 5+5
13. (a) State Wilson's theorem. Find the digit of the unit place of 7^{100} .
(b) What is the remainder when $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$ is divided by 15? 5+5
14. (a) Determine whether the following ISBN is valid— 81-213-0871-9.
(b) Prove that $\phi(5n) = 5\phi(n)$ iff 5 divides n . 5+5

(9)

T(2nd Sm.)-Mathematics-G/(GE/CC-2)/CBCS

- 15.** (a) Express the Boolean function $f = x \cdot y' + (y + z)' \cdot (x + y)$ in DNF in the variables x, y, z .
 (b) Find a switching circuit which realizes the switching function $f(x, y, z)$ given by the following truth table. Simplify the circuit.

x	y	z	$f(x, y, z)$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	0
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	0	0

5+5