

2021

MATHEMATICS — GENERAL

First Paper

Full Marks : 100

Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

প্রাপ্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।

মডিউল - ১

বিভাগ - ক

(মান : ২০)

১নং প্রশ্ন এবং অপর যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। (ক) যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২×১

(অ) বিস্তার না করে প্রমাণ করো যে,
$$\begin{vmatrix} 0 & -2021 & -\alpha \\ 2021 & 0 & \beta \\ \alpha & -\beta & 0 \end{vmatrix} = 0$$
।

(আ) জটিল তলের উপর $P(z)$ এমন চলমান বিন্দু যার $|z + 3i| = 4$; P বিন্দুর সঞ্চারপথ নির্ণয় করো।

(ই) যে সমীকরণের বীজগুলি $-1, 2, -3$ ও 3 সেটি বের করো।

(খ) যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩×১

(অ) ডি ময়ভারস উপপাদ্য অনুযায়ী $x^5 = 1$ সমীকরণটির মান নির্ণয় করো।

(আ) মূলদ সহগযুক্ত একটি চতুর্থ ঘাতের (fourth degree) সমীকরণ বের করো যার একটি বীজ $\sqrt{3} + \sqrt{2}i$ ।

(ই) $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি কি লম্ব ম্যাট্রিক্স?

২। যদি $\sin^{-1}(u + iv) = a + ib$ হয়, তবে প্রমাণ করো $1 + u^2 + v^2 = \sin^2 a + \cos^2 b$ ।

৫

৩। কার্ডানের (Cardan) পদ্ধতিতে সমাধান করো : $x^3 - 24x + 72 = 0$ ।

৫

৪। যদি $x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 7x + 5 = 0$ সমীকরণের বীজগুলি α, β, γ এবং δ হয়, তবে যে সমীকরণের বীজগুলি $\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1$ এবং $\delta + 1$ হয় তা নির্ণয় করো।

৫

Please Turn Over

৫। Cramer-এর পদ্ধতি অবলম্বনে সমাধান করো :

৫

$$3x - 2y + z = -1$$

$$-x + y + 7z = 1$$

$$4x - 3y - 2z = -2$$

৬। A ম্যাট্রিক্সের মাত্রা (rank) নির্ণয় করো :

৫

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 12 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \\ 5 & 10 & 5 \end{bmatrix}$$

বিভাগ - খ

(মান : ১৫)

৭নং প্রশ্ন এবং অপর যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩×১

(ক) k -এর মান নির্ণয় করো যাতে $x^2 + y^2 + 2x + k = 0$ সমীকরণটি একজোড়া সরলরেখা সূচিত করে।

(খ) $\frac{5}{r} = 2 + 4 \cos \theta$ কণিকটির প্রকৃতি নির্ণয় করো এবং এর নাভি-লম্ব (latus rectum)-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(গ) দেখাও যে, $y^2 = 4x$ অধিবৃত্তের সাপেক্ষে $(-1, 5)$ বিন্দুটির পোলার ফোকাসের মধ্য দিয়ে যায়।

৮। $6x^2 - 5xy - 6y^2 + 14x - 5y + 4 = 0$ সমীকরণটিকে আদর্শ আকারে প্রকাশ করো এবং সেখান থেকে বক্রটির (conic) প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৬

৯। $2x^2 - 5xy + 3y^2 - 2x + 3y = 0$ বক্ররেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু থেকে মূলবিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করো। ৬

১০। দেখাও যে $\frac{l}{r} = A \cos \theta + B \sin \theta$ সরলরেখাটি $\frac{l}{r} = 1 + e \cos \theta$ কণিকটিকে স্পর্শ করলে $(A - e)^2 + B^2 = 1$ হবে। ৬

১১। $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের সাপেক্ষে P বিন্দুর পোলার (Polar) $4x^2 + 4y^2 = a^2$ বৃত্তটিকে স্পর্শ করে। দেখাও যে, P বিন্দুর সঞ্চারণপথ $x^2 + y^2 = 4a^2$ । ৬

বিভাগ - গ

(মান : ১৫)

১২নং প্রশ্ন এবং অপর যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১২। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩×১

(ক) x -এর কোন্ মানের জন্য $x\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরগুলি সমতলিক হবে।

(খ) যদি $\vec{\alpha}$ এবং $\vec{\beta}$ ভেক্টর দুটি এরূপ হয় যে, $|\vec{\alpha}| = 23$, $|\vec{\beta}| = 11$ এবং $|\vec{\alpha} + \vec{\beta}| = 20$ হয়, তাহলে $|\vec{\alpha} - \vec{\beta}|$ -এর মান নির্ণয় করো।

(গ) একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করো যা $2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ -এর সঙ্গে লম্ব।

১৩। (ক) ভেক্টর উপায়ে প্রমাণ করো যে একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে।

(খ) প্রমাণ করো যে কোনো প্রকৃত ভেক্টর \vec{a} -এর জন্য $\hat{i} \times (\vec{a} \times \hat{i}) + \hat{j} \times (\vec{a} \times \hat{j}) + \hat{k} \times (\vec{a} \times \hat{k}) = 2\vec{a}$ । ৪+২

১৪। (ক) কোনো কণার ওপর $2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ এবং $3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ স্থির বল দুটি ক্রিয়াশীল হয়ে কণাটিকে $\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ থেকে $4\hat{i} + 5\hat{j} + 7\hat{k}$ বিন্দুতে স্থানচ্যুত করলে সম্পাদিত কার্যের পরিমাণ নির্ণয় করো।

(খ) α -এর মান নির্ণয় করো যাতে $\vec{a} = (2, \alpha, 1)$ এবং $\vec{b} = (4, -2, -2)$ লম্ব হয়। ৪+২

১৫। প্রমাণ করো যে, তিনটি বিন্দু যাদের অবস্থান ভেক্টর হল $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $-\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$ এবং $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$ একটি সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে। ৬

১৬। যদি $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ তিনটি ভেক্টর এমন হয় যে $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$ এবং $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 4$, $|\vec{\gamma}| = 6$, তাহলে দেখাও যে $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} + \vec{\gamma} \cdot \vec{\alpha} = -28$ । ৬

মডিউল - ২

বিভাগ - ক

(মান : ২৫)

১৭। (ক) যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২×১

(অ) $f(x) = \frac{|x|}{x} + 2$ অপেক্ষকটির পাল্লা (range) নির্ণয় করো।

(আ) দেখাও যে, $\{x_n\}$ অনুক্রমটি, যেখানে $x_n = \frac{2n+1}{4n+1}$ ($n \geq 1$), একটি একদিশ্ট অবরোহী।

(খ) যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩×১

(অ) কোনো অপেক্ষক $f(x)$ -এর সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3kx+5}{x-2}, & x \neq 2 \\ 47, & x = 2 \end{cases}$$

k -এর কোন্ মানের জন্য $f(x)$ সম্ভব হবে?

Please Turn Over

$$(আ) f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{যখন } x \text{ মূলদ সংখ্যা} \\ 0, & \text{যখন } x \text{ অমূলদ সংখ্যা} \end{cases}$$

দেখাও যে $f'(0) = 0$ ।

১৮। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) (অ) $\frac{1+2}{2^3} + \frac{1+2+3}{3^3} + \frac{1+2+3+4}{4^3} + \dots$ শ্রেণিটির অভিসারিত্ব ব অপসারিত্ব পরীক্ষা করো।

(আ) $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় করো, যেখানে $(\cos x)^y = (\sin y)^x$ ।

(ই) $y = 2\cos x(\sin x - \cos x)$ দেখাও যে, $(y_{10})_0 = 2^{10}$ ।

৫+৩+২

(খ) (অ) $1 + 2\sin x + 3\cos^2 x$ $\left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ -এর চরম ও অবম মান নির্ণয় করো।

(আ) কেন্দ্রের সাপেক্ষে $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের পাদ সমীকরণ (Pedal equation) নির্ণয় করো।

৫+৫

(গ) (অ) $x^3 + 3x^2y - 4y^3 - x + y + 3 = 0$ সমীকরণটির স্পর্শপ্রবণ রেখাগুলি নির্ণয় করো।

(আ) যদি ρ_1, ρ_2 নাভিগামী কোনো জ্যা-এর প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ে বক্রতা ব্যাসার্ধ হয়, তবে দেখাও যে

$$(\rho_1)^{-2/3} + (\rho_2)^{-2/3} = (l)^{-2/3}$$

৫+৫

(ঘ) (অ) যদি $x = \sin \theta$ এবং $y = \sin k \theta$ হয়, তবে প্রমাণ করো :

$$(I) (1 - x^2)y_2 - xy_1 + k^2y = 0$$

$$(II) (1 - x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} + (k^2 - n^2)y_n = 0$$

(আ) Cauchy's criterion ব্যবহার করে দেখাও যে (x_n) অনুক্রমটি অভিসারী (convergent) যখন

$$x_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}।$$

(২+৩)+৫

বিভাগ - খ

(মান : ১০)

১৯। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২×১

(ক) দেখাও যে, $\int_a^b f(a+b-t) dt = \int_a^b f(x) dx$ ।

(খ) মান নির্ণয় করো : $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$ ।

২০। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সৎজ্ঞা হতে মান নির্ণয় করো : $\int_a^b e^x dx$ ।

(খ) দেখাও যে, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right\}^{\frac{1}{n}} = \frac{4}{e}$ ।

(গ) মান নির্ণয় করো : $\int_0^1 \cot^{-1}(1-x+x^2) dx$ ।

(ঘ) মান নির্ণয় করো : $\int \frac{dx}{5-13\sin x}$ ।

বিভাগ - গ

(মান : ১৫)

২১। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) মূলবিন্দুগামী সরলরেখাগুলির অবকল সমীকরণ নির্ণয় করো ।

(খ) ক্রম ও মাত্রা নির্ণয় করো : $\frac{d^2y}{dx^2} = 4\sqrt{y + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3}$ ।

২২। যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সমাধান করো : $(1+x^2)\frac{dy}{dx} + y = \tan^{-1}x$ ।

(খ) $py = p^2(x-b) + a$ অবকল সমীকরণটির সাধারণ (General) এবং বিশিষ্ট (Singular) সমাধান নির্ণয় করো,

যেখানে $p = \frac{dy}{dx}$ এবং a ও b ধ্রুবকদ্বয় ।

(গ) সমাধান করো : $(x^2y^2 + xy + 1)y dx + (x^2y^2 - xy + 1)x dy = 0$ ।

(ঘ) $\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1$ ($\lambda = \text{Parameter}$) বক্রগোষ্ঠীর লম্ব প্রক্ষেপ পথগুলি (orthogonal trajectories) নির্ণয় করো,

যেখানে a ও b হল ধ্রুবক ।

(ঙ) সমাধান করো : $(y^2 e^{xy^2} + 4x^3) dx + (2xy e^{xy^2} - 3y^2) dy = 0$ ।

Please Turn Over

[English Version]

The figures in the margin indicate full marks.

Module – 1

Group – A

(Marks : 20)

Answer *question no. 1* and *any three* questions from the rest.

1. (a) Answer *any one* question : 2×1

(i) Without expanding prove that
$$\begin{vmatrix} 0 & -2021 & -\alpha \\ 2021 & 0 & \beta \\ \alpha & -\beta & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

(ii) On the complex plane, let $P(z)$ be a variable point such that $|z + 3i| = 4$. Find the locus of P .

(iii) Find the equation whose roots are $-1, 2, -3$ and 3 .

- (b) Answer *any one* question : 3×1

(i) Solve $x^5 = 1$, by using De Moivre's Theorem.

(ii) Find the equation of fourth degree with rational coefficients, one root of which is $\sqrt{3} + \sqrt{2}i$.

(iii) Is the matrix $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ orthogonal?

2. If $\sin^{-1}(u + iv) = a + ib$, then prove that $1 + u^2 + v^2 = \sin^2 a + \cosh^2 b$. 5

3. Solve by Cardan's method : $x^3 - 24x + 72 = 0$. 5

4. If α, β, γ and δ are the roots of the equation $x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 7x + 5 = 0$, find the equation whose roots are $\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1$ and $\delta + 1$. 5

5. Solve by Cramer's Rule 5

$$3x - 2y + z = -1$$

$$-x + y + 7z = 1$$

$$4x - 3y - 2z = -2$$

6. Find the rank of the matrix A , where $A = \begin{bmatrix} 6 & 12 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \\ 5 & 10 & 5 \end{bmatrix}$. 5

Group – B**(Marks : 15)**Answer **question no. 7** and **any two** questions from the rest.

7. Answer **any one** question : 3×1
- (a) Find the value of k , for which $x^2 + y^2 + 2x + k = 0$ represents a pair of straight lines.
- (b) Determine the nature of the conic $\frac{5}{r} = 2 + 4\cos\theta$ and also find the length of its latus rectum.
- (c) Show that the polar of the point $(-1, 5)$ with respect to the parabola $y^2 = 4x$ passes through the focus.
8. Reduce the equation $6x^2 - 5xy - 6y^2 + 14x - 5y + 4 = 0$ to its canonical form and hence determine the nature of the conic. 6
9. Find the distance from the origin of the point of intersection of the straight lines given by $2x^2 - 5xy + 3y^2 - 2x + 3y = 0$. 6
10. Show that if $\frac{l}{r} = A\cos\theta + B\sin\theta$ touches $\frac{l}{r} = 1 + e\cos\theta$, then $(A - e)^2 + B^2 = 1$. 6
11. The polar of the point P with respect to the circle $x^2 + y^2 = a^2$ touches the circle $4x^2 + 4y^2 = a^2$. Show that the locus of P is $x^2 + y^2 = 4a^2$. 6

Group – C**(Marks : 15)**Answer **question no. 12** and **any two** questions from the rest.

12. Answer **any one** question : 3×1
- (a) Find the value of x for which the vectors $x\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ and $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ are coplanar.
- (b) If $\vec{\alpha}$ and $\vec{\beta}$ are two vectors such that $|\vec{\alpha}| = 23$, $|\vec{\beta}| = 11$ and $|\vec{\alpha} + \vec{\beta}| = 20$, find $|\vec{\alpha} - \vec{\beta}|$.
- (c) Find an unit vector perpendicular to $2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ and $3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$.
13. (a) Prove by vector method that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other.
- (b) Prove that, for any proper vector \vec{a} , $\hat{i} \times (\vec{a} \times \hat{i}) + \hat{j} \times (\vec{a} \times \hat{j}) + \hat{k} \times (\vec{a} \times \hat{k}) = 2\vec{a}$. 4+2
14. (a) A particle acted on by constant forces $2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ and $3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ is displaced from the point $\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ to the point $4\hat{i} + 5\hat{j} + 7\hat{k}$. Find the amount of work done.
- (b) Determine the value of α so that $\vec{a} = (2, \alpha, 1)$ and $\vec{b} = (4, -2, -2)$ are perpendicular. 4+2

Please Turn Over

15. Prove that the three points whose position vectors are $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $-\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$ and $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$ form an equilateral triangle. 6
16. If $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ are three vectors such that $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$ and $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 4$, $|\vec{\gamma}| = 6$, then show that $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} + \vec{\gamma} \cdot \vec{\alpha} = -28$. 6

Module – 2

Group – A

(Marks : 25)

17. (a) Answer **any one** question : 2×1

(i) Find the range of the real-valued function of a real variable, $f(x) = \frac{|x|}{x} + 2$.

(ii) Show that the sequence $\{x_n\}$, where $x_n = \frac{2n+1}{4n+1}$ ($n \geq 1$), is monotonically decreasing.

- (b) Answer **any one** question : 3×1

(i) A function $f(x)$ defined by $f(x) = \begin{cases} \frac{3kx+5}{x-2}, & x \neq 2 \\ 47, & x = 2 \end{cases}$. For what value(s) of k , $f(x)$ is continuous?

(ii) Let $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{when } x \text{ is rational} \\ 0, & \text{when } x \text{ is irrational} \end{cases}$.

Show that $f'(0) = 0$.

18. Answer **any two** questions :

(a) (i) Examine the convergence of the series : $\frac{1+2}{2^3} + \frac{1+2+3}{3^3} + \frac{1+2+3+4}{4^3} + \dots$

(ii) Find $\frac{dy}{dx}$, if $(\cos x)^y = (\sin y)^x$.

(iii) $y = 2\cos x(\sin x - \cos x)$. Show that $(y_{10})_0 = 2^{10}$. 5+3+2

(b) (i) Find the maxima and minima of $1 + 2\sin x + 3\cos^2 x$ $\left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$.

(ii) Find the pedal equation of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ with respect to centre. 10

- (c) (i) Find the asymptote of the curve $x^3 + 3x^2y - 4y^3 - x + y + 3 = 0$.
(ii) Prove that the radii of curvature ρ_1 and ρ_2 at the extremities of a focal chord of a parabola whose semi-latus rectum is l , then $(\rho_1)^{-2/3} + (\rho_2)^{-2/3} = (l)^{-2/3}$. 5+5
- (d) (i) If $x = \sin \theta$ and $y = \sin k \theta$, prove that
(I) $(1 - x^2)y_2 - xy_1 + k^2y = 0$
(II) $(1 - x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} + (k^2 - n^2)y_n = 0$
- (ii) Use Cauchy's criterion to show that the sequence (x_n) converges, when

$$x_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}. \quad (2+3)+5$$

Group – B**(Marks : 10)****19.** Answer *any one* question :

2×1

(a) Show that $\int_a^b f(a+b-t) dt = \int_a^b f(x) dx$.

(b) Find $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$.

20. Answer *any two* questions :

4×2

(a) Evaluate $\int_a^b e^x dx$ from definition.

(b) Show that $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right\}^{\frac{1}{n}} = \frac{4}{e}$.

(c) Evaluate $\int_0^1 \cot^{-1}(1 - x + x^2) dx$.

(d) Evaluate $\int \frac{dx}{5 - 13 \sin x}$.

Please Turn Over

Group – C

(Marks : 15)

21. Answer **any one** question :

3×1

(a) Find the differential equation of all straight lines passing through the origin.

(b) State the order and degree of $\frac{d^2y}{dx^2} = 4\sqrt{y + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3}$.22. Answer **any three** questions :

4×3

(a) Solve $(1 + x^2)\frac{dy}{dx} + y = \tan^{-1} x$.(b) Obtain the general and singular solution of $py = p^2(x - b) + a$, where $p = \frac{dy}{dx}$ and a, b constants.(c) Solve $(x^2y^2 + xy + 1)y dx + (x^2y^2 - xy + 1)x dy = 0$.(d) Obtain the orthogonal trajectories of the family of curve $\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1$, where λ is the arbitrary parameter and a and b are given constants.(e) Solve $(y^2e^{xy^2} + 4x^3)dx + (2xye^{xy^2} - 3y^2)dy = 0$.
